

斃シ得ル譯デアル。然ルニ其ノ種名ヲ *edule* トイフハ Malay 群島土人が此ノ種子ヲ永ク水ニ浸シ毒ヲ去ツテ食シ或ハ其ノ油ヲ食用油ニ供スルニ因ル。屬名ハ Philippine ノ土名 Pangi ニヨル。邦領南洋「ボナペ」島デハ本植物ヲ Manka, 「バラオ」島デハ Drian ト言ツテ居ル。(刈米達夫)

○ *Chrysosplenium rhabdospermum* MAXIMOWICZ

本種ハ 1877 年 MAXIMOWICZ ガ長崎附近デ採集シタ標本ニ基キ記載シタモノデ、FRANCHET ノ Monograph ニモ圖解サレテキルガ、我國デハ久シク不明ノ品デアツタ。一昨年京大ノ大井次三郎氏ハ九州中南部ニ産スル *Chrysosplenium Doianum* トイフ一新種ヲ發表サレ、*C. rhabdospermum* ニ似テキルガ別物デアルト附記サレテキル。其後大井氏ノ御好意ニヨリソノ Duplicate type ヲ戴キ、又土井美夫氏ヨリノ標本ヲ見テ、ソノモノガ *C. rhabdospermum* ニ非常ニ近イモノデアルコトヲ知ツタ。一方昨春長崎ノ英國領事 F. C. GREATREX 氏ヨリ肥前、多良岳南麓、境川ノ谷デ採集サレタ一種ノねこのめさうヲ送ラレタ。調べテミルト *C. rhabdospermum* ニヨク一致シソノ產地ヨリ考ヘテモ同種ニ相違ナイシ、又 *C. Doianum* ト比較シテ同種デアロウト思ヒ左様返答シテオイタ。今春更ニ同氏ヨリ澤山ノ生品ヲ送ツテ貰ヒ、ソノ變化ノ範圍ヲ充分ニ知ル事ガデキ、ソノアル個體ハ *C. rhabdospermum* ニ全ク符合シ、又ソレガ *C. Doianum* ト同一種デアルトノ確信ヲ得タ。カクシテ永ラク疑問デアツタ本種ハ九州ニ可成リ廣ク分布シテキル事が分ツタ。和名トシテハ大井氏ノツケラレタつくしねこのめヲ用フベキデアル。尙 FRANCHET 氏ハ富士山及ビ信州ノ標本ヲ引用シテキルガコレハ誤デアロウ。以上ヲマトメルト次ノ様ニナル。

Chrysosplenium rhabdospermum MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersb. XXIII, p. 347 (1877)—FRANCHET in Nouv. Archiv. Museum. Hist. Nat. ser. 3, III (Monogr. Chrysosplen. II), p. 10, pl. 4. C (1891) excl. specim. ex Honshu—MATSUMURA, Ind. Pl. Jap. II-2, p. 175 (1912)—MAKINO et NEMOTO, Fl. Jap. p. 852 (1925); ed. 2, p. 430 (1931)

Syn. *Chrysosplenium Doianum* OHWI in Acta Phytotax. et Geobot. II, p. 105 (1933)
Nom. Jap. *Tsukushi-nekonome* (OHWI 1933).

Hab. Kyushu (prov. Hizen, Higo, Hiuga et Satsuma).

Planta endemica. (H. HARA)

(原 寛)